

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

КТ органов брюшной полости и малого таза Через 3 часа после последнего приема пищи. Прибыть в отделение рентгенодиагностики за 30 мин до назначенного времени для постановки в/венного катетера. В течение получаса перед исследованием медленно выпить 500 мл воды

КТ мочевой системы Через 3 часа после последнего приема пищи. Прибыть в отделение рентгенодиагностики за 30 мин до назначенного времени для постановки в/венного катетера. В течение получаса перед исследованием медленно выпить 500 мл воды

ПОДГОТОВКА К МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯМ

МР-холангиопанкреатография

Исследование проводится строго натощак или через 6 часов после последнего приема пищи, за 3 часа до исследования не пить

Прибыть в отделение рентгенодиагностики за 30 мин до назначенного времени для постановки в/венного катетера.

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Исследование проводится через 3 часа после последнего приема пищи. Рекомендуется необильное питье (не должно быть чувства жажды). За 2 дня до исследования необходимо соблюдать бесшлаковую диету. За 6–8 часов принять 2 таблетки спазмолитического препарата.

Прибыть в отделение рентгенодиагностики за 30 мин до назначенного времени для постановки в/венного катетера.

МРТ таза

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА: Исследование проводится через 3 часа после последнего приема пищи. Можно принимать лекарства с небольшим количеством воды. За 2 дня до исследования необходимо соблюдать бесшлаковую диету. Утром перед исследованием выполняется очистительная микроклизма. За 30 минут до назначенного времени исследования принять спазмолитический препарат в таблетированной форме. Различные виды МРТ таза требуют дополнительной подготовки:

1. МРТ таза (гинекология): исследование выполняется в любой день кроме дней менструации, если не назначено иначе.
2. МРТ предстательной железы: если выполнялась биопсия простаты, то МРТ проводится не ранее, чем через 1 месяц после нее (или по назначению врача).
3. МРТ таза (другие исследования: проктологическое, кости таза и пр.): женщинам в период отсутствия менструаций. 4. МРТ (мочевой пузырь): за 30–60 минут до исследования не мочиться.

Для оптимизации МРТ- и КТ- диагностики НЕОБХОДИМО направление специалиста с предварительным диагнозом, целью и задачами исследования. При обращении для оценки динамики ранее выявленного заболевания, либо для уточнения данных других методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ, ангиография, сцинтиграфия, ПЭТ и др.) НЕОБХОДИМО принести с собой результаты (снимки, заключения, CD-/DVD-записи) вышеперечисленных методик. Крайне желательно ПРИНЕСТИ имеющиеся клинические выписки (амбулаторная карта, эпикризы, консультативные заключения) по теме интересующего заболевания.